

חזרה לשגרה לאחר לידה דגשים לילדת אחר לידה קיסרית באדיות שירות הפיזיותרפיה

תקופת "משכב הלידה" נמשכת 10-8 שבועות לאחר לידה. זה זמן ההתחושים מהשינויים אוטם חווית תקופת ההריון ובלידה, תקופת הבירה והסתגלות לילוד החדש. בימים לאחר הלידה הקיסרית יתכן ותחווי תופעות הקשורות להיוותר של יולדת טרייה וככלו הקשורות להיוותרasha לאחר ניתוח בטני.

כאבים: בימים הראשונים לאחר הניתוח יתרכן ותחושי כאבים באזורי הצלקת הניתוחית, כאבים כתוצאה מהתכווצות הרחם וגם במידה והיה ניסיון לילוד נרתיקי- כאבים באזורי חיז' הנקבים (האזור בין הנרתיק לפין הטעבה).

כשכוاب לנו אנחנו עושים פחות! נשמים פחות, זדים פחות, הולכים פחות. מומלץ ורצוי ליטול משככי כאבים להקללה על הכאב.

ניתן לבצע נסימות רגועות בטניות ובשבועות לאחר הלידה ניתן להתחיל ולמרוח משחות טבעיות העוזרות לריפוי התפרים ולהקללה על כאבים.

קושי במעברים ובനידות: יתרכן ותחושי קושי ביצוע מעברים (מעבר לישיבה/לשכיבה/לעמידה) בשל כאבים / סחרורת לאחר ניתוח.

לצורך קומה וכונה השטדיי לkom בדרכ שאיונה מעלה עומס על הבطن ועל אזור החתר-ך. דרך אחת: הסתובבי בזהירות לשכיבה על הצד, הורידי רגלים מהמיטה ועזרו לעצמך לkom בעזרת הידיים.

דרך נוספת: הרימי מראשות המיטה לישיבה מלאה, הורידי רגלים מהמיטה ועברי לישיבה על המיטה.

הקפידי לבצע כל מאמץ תוך נשיפה (הוצתת אויר איטית) להורדת עומס מהבטן. בצעי מעברים באיטיות למניעת סחרורות וקומי להליכה רק אחרי שהסחרורת עברה. בזמן הליכה- נסי להזדקף לעמידה זקופה ככל האפשר תוך כדי נשימה. בימים הראשונים ניתן לתמוך בבטן בזמן הליכה לצורך הקלה.

ニידות מרובה מובילה להחלמה מהירה יותר ולמניעת סיבוכים לשכיבה ממושכת.

שיעול ועיטוש: אלו פעולות אשר מעלו את החלץ התוך בטני ומעוררות כאב בימים הראשונים לאחר ניתוח. הנחת כריתת על אזור החתר הניתוחי ותמייה עדינה באמצעות צורק קיבוע תקל על הכאב בזמן הפעולה.

יציאות: יתרכן קושי במתן שתן וצואה לאחר ניתוח. במידה וקיים קושי במתן שתן - שבי על האסללה, נשמי נשימות בטניות ונסי להרפות את רצפת האגן.

להקללה על יציאה - הימנע מהתפקיד, הקפידי על שתייה ואכילת מזונות מתאימים לריכוך הצואה. המנע מלחיצה ומישיבה ממושכת בשירותים. על מנת להקל על

היציאה הניחי כפות רגלייך על שפרף, נסי להתפנות תוך נשיפה איטית וארכוכה להפחחת עומס מהבטן.

הצלקת הניתוחית: בימים הראשונים שלאחר הלידה יש לשטוף את הצלקת היטב עם מים וסבון רגיל, בהמשך ניתן להשתמש בתכשורים טבעיים המסיעים להקלת על הכאבם ולהחלמת התפרים. לאחר שהצלקת סגורה ניתן להניח ירידת סיליקון לשיפור תהליך ההצלקות. את הסיליקון ניתן לרכוש בבתי המרכחת.

במידה ובחוודשים לאחר הלידה עדין ישם כאבים/רגשות או הפרעות בתחושה באזורי הצלקת- יש לגשת לפיזיותרפיסטית המתמחה במערכות הלימפהטיות/ בתחום רצפת האגן.

חזזה לפעולות לאחר הניתוח: בתקופה הראשונה שלאחר הניתוח ניתן להתחיל לבצע הליכות מתרונות. עשוי זאת בהדרגה, הקשייבי לגוף וחזי סימני עייפות משמעותיים, סחרחות וכאבים לאחר פעילות.

המניע מהרמת משאות, הקפידי על יציבה וכוננה, תמייכה בגב ובשכבות בזמן הנקה או האכליה ועל סימטריה בנשיות התינוק והאכלתו. לאחר תום משכב הלידה וביקורת הרופא ניתן ורצוי לחזור לפעולות גופניות בצוואר מכוברת והדרגתית.

בתקופה זו שורי רצפת האגן (השרירים הנמצאים בתחום האגן, תומכים באיברי האגן ומרכזים את סוגרי השופכה, ופי הטענת), שורי הבطن ושאר הרקמות הגוף עדין חלשים ורפואיים ולכן חשובים יותר להשפעת עומסים יומיומיים. שורי הבطن שנמתחו בהירין ועברו חיתוך בזמן הניתוח החלשים ויש להתחיל לחזקם בצוואר נכונה והדרגתית, להקפיד על נשימה נכונה (נשיפה בזמן ביצוע מאץ) בזמן ביצוע תרגילים המעלים לחץ תוך בטני.

גם אשה שעברה לידה קיסרית עלולה לסבול מ导师ות הקשורות בליקויים ברצפת האגן: בירחوت שתקן, גזים או צואה, כאבים באזורי האגן או הגב התיכון, תחושת כבדות או בלט באזורי הנרתיק, במידה ואת סובלת מהן"- מומלץ להוועץ עם פיזיותרפיסטית לרצפת האגן. מומלץ לכל אשה לאחר לידה נרתיקית או קיסרית להבדק ע"י פיזיותרפיסטית של רצפת האגן.

במחלקת היולדות בהיל יפה מבוצעת פעמיים בשבוע סדנה בנושא בריאות האגן וחזרה לשגרה לאחר לידה. במכון הפיזיותרפיה ב"hil Yafe" מתקיים טיפולים אמבולטוריים לשיקום רצפת האגן, הניתנים על ידי פיזיותרפיסטית בעלת הכשרה בתחום.

מזל טוב.

**שירות הפיזיותרפיה הליל יפה.
לפרטים ולקביעת תור ניתן לפניות
טל': 04-7744567**