

# דף הדרכה למטופל לאחר ניתוח פלסטי

מטופל יקר,

להלן הליכים כירוגיים בדומה לניתוח שעברת משפיעים על מגנון נשימה התקין. הנשמה מלאכותית בזמן הניתוח וכאב שמקורה בהילך ניתוחי עלולים לגרום לנידות מופחתת, לירידה בנפח הנשימה ולהימנעות משיעול. כתוצאה לכך עלולים להיגרם סיבוכים נשימתיים כגון: קשיי נשימה, הצטברות הפרשות וחום.

על מנת לעכור את תקופת החלהמה שלאחר ניתוח באופן מיטבי ולמנוע סיבוכים אילו, מצורפות מספר המלצות והנחיות לתרגול עצמי.  
יום לאחר ניתוח יגיע פיזיותרפיסט למתן הדרכה נוספת ומענה על שאלות.

## תנוועתיות ונידות - באישור ותיאום עם צוות רפואי וסיעודי של המחלקה.

- ישיבה עדיפה על פני שכיבה. אם לא ניתן לשכט בכורסא יש לשכט בשכבה גבואה בmitah.
- רצוי לעמוד ולהתהלך מוקדם ככל ניתנן. בפעמים הראשונות יש להתהלך בליווי ובמשך מומלץ להתהלך לעיתים קרובות.

## תרגילי נשימה - את תרגילי הנשימה הבאים יש לבצע באופן עצמאי מוקדם ככל ניתנן לאחר ניתוח. מומלץ לבצע את התרגילים מספר פעמיים ביום.

- נשימה عمוקה - יש לקחת אויר עמוק ככל ניתנן, להרבות ולתת לאוויר לצאת בחופשיות. לחזור על התרגיל 5 פעמיים.
- HOLD - יש לקחת אויר מלאה הריאות להחזיק כ- 3 שניות, להרבות ולתת לאוויר לצאת בחופשיות. לחזור על התרגיל 5 פעמיים.
- לאחר כל 5 נשימות עמוקות יש לנשום רגיל למשך כדקה.
- שיעול - יש לנשום עמוק ולהשתען, ניתן לתמוך באוזור המנותח בעזרת כרית. השיעול אינו גורם נזק.
- מכשיר לתרגול עצמי (TRIFLO) ניתן על ידי הפיזיותרפיסט בהתאם לצורך. יש לשים את הצינורית בפה ולבתו היבכ עם השפטים את הפיה על מנת למנוע בריחת אויר. לקחת שאיפה איטית ועמוקה, להעלות כדור אחד ולנסות להחזיק אותו באוויר כ-2 שניות, לחזור על התרגול 5 פעמיים. לאחר מכן להפוך את המכשיר, לנשוף ולהעלות כדור אחד. לחזור על התרגול 5 פעמיים.
- לאחר 24 שעות ניתן להפעיל גפיים עליונות. יש להרים את הידיים למעלה ולנשום עמוק, לחזור על התרגול 5 פעמיים.

## חוּדרה לשגרה תבצע באופן הדורגי ובהתאם להנחיות הבאות:

- פעילות בעצימות ומוכה עד בינויית (הליכה, שחיה, ריצה קלה) לאחר חודש.
- פעילות בעצימות גבוהה (TRX, שריריו בטן, יוגה, פילטים, ריצה, ספורט תחרותי) לאחר 3 חודשים.